Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 147, nouv. série n° 40 (3), 2012 : 269.

Sur la présence en Gironde de *Cantacader quadricornis* (LE PELETIER & AUDINET-SERVILLE) (Hemiptera Tingidae)

Patrick DAUPHIN
6 place Amédée Larrieu, 33000 Bordeaux – [patrick.dauphin@dartybox.com]

Cantacader quadricornis est la seule espèce européenne de la sous-famille des Cantacaderinae (considérée par certains auteurs comme une famille autonome, les Cantacaderidae), caractérisée par le fait que le clavus de l'élytre est bien visible en vue dorsale et non réduit et masqué par le scutellum comme chez les Tinginae. C'est une espèce ponto-méditerranéenne, considérée comme rare en France, où elle est signalée de quelques départements méridionaux : Tarn, Landes, Haute-Garonne, Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Var, Alpes-Maritimes, Corse. La biologie de cette espèce est à peu près inconnue ; on sait qu'elle hiverne à l'état adulte, et que l'on peut la rencontrer toute l'année, dans des biotopes variés (PÉRICART, 1983).

Cantacader quadricornis est aussi signalé du Gard par J.-L. HENTZ (http://www.naturedugard.org/atlas.php?id_groupe=16&id_sp=237355).

Plusieurs exemplaires ont été pris récemment à Villeton (Lot-et-Garonne) dans la Réserve Naturelle de l'étang de la Mazière par J.-P. Tamisier, mais je n'avais pas connaissance de captures en Gironde (DAUPHIN, 2009).

Au cours d'une sortie à Fontet (Gironde), le 10 décembre 2011, j'ai pris six exemplaires de ce Tingide (Fig. 1) par battage de plantes basses dans la propriété de Gaëtan Galman, qui nous avait aimablement conviés à échantillonner sur ce site, et que nous remercions vivement…

DAUPHIN (P.), 2009. - Les Hémiptères phytophages de Gironde. Hétéroptères phyllophages. *Mémoires de la Société Linnéenne de Bordeaux*, tome 10 : 204 p.

PÉRICART (J.), 1983. - Hémiptères Tingidae euroméditerranéens. Faune de France 69, F.F.S.S.N. Paris : 620 p.

Fig. 1. *Cantacader quadricornis*, longueur 4,3 mm (photo M. Laguerre).